

Negatieve gevolgen van mondademhaling en een afwijkend slikgedrag:

- * Lage lipdruk, daardoor kunnen de voortanden erg naar voren gaan staan, en lipsluiting wordt dan bemoeilijkt.
- * Bij slikken spant de spier op de kin zich aan ter compensatie van lage lipdruk, dit kan scheve ondertanden veroorzaken.
- * Tongpersen kan een open beet veroorzaken doordat de tong de tanden belemmert bij doorbraak
- * Lage tongpositie = tong op de mondbodem(tong hoort in rust tegen het gehemelte te liggen), waardoor de tong het gehemelte en de bovenkaak niet goed vormt. Dit kan scheve tanden en/of een kruisbeet (onderkiezen staan meer naar buiten dan de bovenkiezen), tot gevolg hebben.
- * Lage tongpositie en een afwijkende slik hebben een negatieve invloed op het doorbreken van de blijvende tanden.
- * kans op onderontwikkelde spieren bij de wangen, waardoor er verticale kaakontwikkeling ontstaat (lang gezicht).
- * kans op kaakgewrichtsproblemen in de toekomst, waardoor er hoofdpijn/ migraine en/of nek klachten kunnen gaan optreden.
- * een houdingsprobleem wat later nek en/of rugklachten kan veroorzaken.
- * slechte mondhygiëne door minder speekselaanmaak wat cariës veroorzaakt.
- * ontstoken tandvlees.
- * Bij een open beet kan overbelasting van de grote kiezen ontstaan, wat afsterven van de zenuw tot gevolg heeft en/of botafbraak rondom de kiezen waardoor ze los gaan staan en mogelijk verloren gaan.
- * wallen onder de ogen.
- * onderontwikkeling van de neus- en keelholtes, waardoor een gevoel van obstructie kan ontstaan (belemmering in ademhaling).
- * groei van de onderkaak wordt geremd.
- * neusslijmvlies wordt niet gebruikt en is vaak geïrriteerd en gezwollen, wat een tweeledig gevoel van obstructie geeft en dus de neusademhaling bemoeilijkt.
- * het kind is vatbaar voor verkoudheid omdat de lucht niet gereinigd wordt. Verkoudheid kan zelfs chronisch worden en het kind kan hiermee een drieledig gevoel van obstructie ervaren.
- * de buis van Eustachius wordt minder gereinigd, waardoor er middenoor problematiek zoals oorontstekingen kunnen ontstaan.
- * er is minder zuurstoftoevoer richting de hersenen wat van invloed is op de leerprestaties.
- * kind is sneller moe bv. tijdens het sporten.

Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met het behandelen van afwijkend mondgedrag !